QUESTIONS À L'AUTEUR

Revue : NEUADO	Merci de retourner vos réponses par e-mail ou par fax à :
	Numéro d'article : 735	E-mail : corrections.esme@elsevier.thomsondigital.com Fax : +33 (0) 1 71 16 51 88

Cher auteur,

Vous trouverez ci-dessous les éventuelles questions et/ou remarques qui se sont présentées pendant la préparation de votre article. Elles sont également signalées dans l'épreuve par une lettre « Q » suivie d'un numéro. Merci de vérifier soigneusement vos épreuves et de nous retourner vos corrections soit en annotant le PDF ci-joint, soit en les listant séparément.

Pour toute correction ou modification dans les figures, merci de consulter la page <http://www.elsevier.com/artworkinstructions>.

Articles de numéros spéciaux : merci d'ajouter (dans la liste et dans le corps du texte) la mention « dans ce numéro » pour toute référence à d'autres articles publiés dans ce numéro spécial.

Références non appelées : Références présentes dans la liste des références mais pas dans le corps de l'article – merci d'appeler chaque référence dans le texte ou de les supprimer de la liste.	
Références manquantes : Les références ci-dessous se trouvaient dans le texte mais ne sont pas présentes dans la liste des références. Merci de compléter la liste ou de les supprimer du texte.	
Emplacement dans l'article	Question / Remarque Merci d'insérer votre réponse ou votre correction à la ligne correspondante dans l'épreuve
Q1	Merci de vérifier que les prénoms et les noms ont été correctement identifiés.
Q2	Merci de nous transmettre la déclaration de conflits d'intérêts désormais obligatoire.
Q3	Merci de mettre la référence [5] à jour en nous transmettant au la to maison et les folios.
Q4	Merci de mettre les références [21,44,66] à jour en nous transmettant au minimum le DOI.

Utilisation des fichiers électroniques

Si nous n'avons pas pu exploiter le fichier de votre article et/ou de vos figures, nous avons utilisé la méthode suivante :

Scan de (ou de parties de) votre article

Ressaisie de (ou de parties de) votre article

Scan des figures

Merci de votre collaboration.

Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com

ARTICLE ORIGINAL

Utilisation des antipsychotiques chez l'enfant et l'adolescent

Use of antipsychotics in child and adolescent

O. Bonnot^{a,*}, L. Holzer^b

^a Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, centre maladies rares à expression psychiatrique, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, AP–HP, 47-83, boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris, France

^b Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, 48, avenue de Beaumont, 1011 Lausanne – CHUV, Suisse

MOTS CLÉS

Antipsychotiques ;
Enfant ;
Adolescent ;
Syndrome
métabolique ;
Effets indésirables

Résumé Initialement réservés aux psychoses non affectives, comme leur nom est censé l'indiquer, les antipsychotiques ont vu leurs indications s'étendre aux troubles de l'humeur et aux troubles du comportement. Les antipsychotiques de seconde génération (APSG) sont communément prescrits en France et en Europe dans le champs de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Cependant, comme en pédiatrie en général, ils sont le plus souvent prescrits hors autorisation de mise sur le marché (AMM). Les APSG, comme les AP de première génération (AP1), ont montré une certaine efficacité, y compris dans les populations pédiatriques, pour le traitement de nombreuses pathologies psychiatriques, en particulier les troubles du spectre de la schizophrénie, les troubles bipolaires et les troubles du comportement chez les patients autistes ou avec déficience intellectuelle. Cependant, des données récentes suggèrent que les enfants et les adolescents seraient plus sensibles que les adultes à certains effets indésirables, en particulier les prises de poids, la somnolence, le syndrome métabolique et l'hyperprolactinémie. Dans cette population, plus encore que chez l'adulte, l'évaluation et la prise en compte du rapport bénéfice/risque est essentielle. La littérature scientifique montre que les études sont moins nombreuses que dans les populations adultes ; ce point est particulièrement notable pour les troubles du comportement sans retard mental (qui sont une catégorie nosographique particulièrement hétérogène) et les schizophrénies à début précoce. C'est la question de la tolérance qui doit pondérer l'enthousiasme initial pour les APSG, notamment par rapport au risque métabolique. Il apparaît aujourd'hui que le profil de tolérance qui est différent en fonction des produits est également variable selon l'âge du sujet. En attendant le développement de nouvelles molécules, plus spécifiques dans leurs actions thérapeutiques et avec un meilleur profil de tolérance que les APSG, des études importantes incluant des populations pédiatriques et adultes sont absolument nécessaires et devront s'effectuer sur de longues

* Auteur correspondant.

Adresses e-mail : olivier.bonnot@psl.aphp.fr (O. Bonnot), laurent.holzer@chuv.ch (L. Holzer).

durées. Des études comparatives avec des AP1 sont également souhaitables, Seuls ces types d'études permettront une réelle évaluation du rapport bénéfice/risque des APSG et de leur légitimité comme traitement de première intention chez l'enfant et l'adolescent.

© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.

KEYWORDS

Antipsychotics;
Efficacy;
Side effects;
Metabolic syndrome

Summary Antipsychotics are commonly prescribed in France and Europe in the field of child and adolescent psychiatry. However, most of the prescriptions are outside reglementary rules (AMM or PUMA). Second Generation AntiPsychotics (SGAP) have show their efficacy in many psychiatric diseases, especially in schizophrenia spectrum disorders, bipolar disorders or behaviour disorders in autism and intellectual deficiency patients. However, recent data suggest that child and adolescent population patients may have a different tolerance profile when compared with adults. This last point leads to a better assessment of the benefice/risk ratio in this population when using SGAP. It is important to notice that there are still few studies in the field of child and adolescent psychiatry, especially regarding behaviour disorder associated with autism spectrum disorders or intellectual deficiency. Authors of this article present a review of the literature regarding efficacy and tolerance of SGAP and call for further studies in this specific population, particularly in the basement of side effects. Moreover, randomized controlled studies comparing SGAP and first generation AP are needed as better tolerance is considered to be the key argument in the actual consensus of SGAP first choice in treatment.

© 2011 Published by Elsevier Masson SAS.

Introduction

La prévalence des troubles psychiatriques invalidants chez l'enfant et l'adolescent est estimée à 20% [1], ils font l'objet d'une reconnaissance accrue par la société et d'une attention particulière de l'industrie pharmaceutique. Alors que les efforts de recherche en psychopharmacologie peinent à trouver de nouvelles molécules ayant des actions spécifiques sur les différents troubles mentaux, une tendance à la généralisation des indications pour les molécules existantes s'est dessinée très nettement. Initialement réservés aux psychoses non affectives, comme leur nom est censé l'indiquer, les antipsychotiques ont vu leurs indications s'étendre aux troubles de l'humeur et aux troubles du comportement. Les antipsychotiques de seconde génération (APSG) sont communément prescrits en France et en Europe dans le champs de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent [2,3]. Cependant, comme en pédiatrie en général, ils sont le plus souvent prescrits hors autorisation de mise sur le marché (AMM).

Les APSG ont montré une certaine efficacité, y compris dans les populations pédiatriques, pour le traitement de nombreuses pathologies psychiatriques, en particulier les troubles du spectre de la schizophrénie, les troubles bipolaires et les troubles du comportement chez les patients autistes ou avec déficience intellectuelle. Cependant, des données récentes suggèrent que les enfants et les adolescents seraient plus sensibles que les adultes à certains effets indésirables, en particulier les prises de poids, la somnolence, le syndrome métabolique et l'hyperprolactinémie [4-6]. Dans cette population, plus encore que chez l'adulte, l'évaluation et la prise en compte du rapport bénéfice/risque est essentielle. Cet article propose une revue critique de la littérature tant sur l'efficacité que sur la tolérance des APSG chez l'enfant et l'adolescent.

Efficacité

Efficacité dans les schizophrénies à début précoce

Les schizophrénies sont, toutes formes confondues des pathologies fréquentes (0,5 à 1% de la population générale) [7]. Il apparaît que cette pathologie est d'autant plus rare qu'elle est précoce. On estime que sur l'ensemble des patients présentant des schizophrénies, 1% vont développer une schizophrénie à début précoce avant l'âge de dix ans, 4% avant 15 ans et enfin 43% des hommes et 28% des femmes, avant 19 ans [7].

La prise en charge de ces pathologies sévères donne une place importante aux médicaments antipsychotiques, en particulier les APSG. L'essentiel des prescriptions chez l'enfant et l'adolescent se fait « hors cadre réglementaire ». L'AMM des APSG, qui peut varier selon les pays et les indications, implique, pour la France, une prescription à partir de 15 ans (aripiprazole et amisulpride), de 16 ans (clozapine) ou de 18 ans (olanzapine et risperidone). L'aripiprazole et la risperidone sont les plus couramment utilisées, la clozapine est réservée aux formes dites résistantes. L'amisulpride dispose de peux d'étude, en raison de son absence sur le marché américain. Il est à noter que, aux États-Unis, depuis mars 2010, l'aripiprazole, la risperidone et l'olanzapine dispose d'une approbation de la *food and drug administration* (FDA)¹ pour une prescription dans cette indication chez les adolescents de 13 à 17 ans.

Les études chez l'adultes ont montré une efficacité des APSG similaire à celle des AP de première génération (AP1) avec une tolérance bien meilleure [8], essentielle-

¹ Organisme réglementaire des États-Unis.

ment par rapport aux effets secondaires extrapyramidaux. Ces données justifieraient l'utilisation en première intention des APSG [9]. Chez l'enfant et l'adolescent, nous disposons de bien moins d'étude. Une méta-analyse « un peu ancienne » montre une meilleure efficacité des antipsychotiques de première génération (taux d'amélioration à l'échelle d'impression clinique globale [CGI] ≤ 3 ou à la Brief Psychiatric Rating Scale [BPRS] [lorsqu'il n'y a pas de CGI]) [10]. Huit études concernent les APSG, contre 13 concernant les AP1, pour un total de 85 sujets et 209 respectivement, âgés de six à 18 ans. Le taux de patients répondeurs est sensiblement supérieur pour les AP1 (55 % vs 72 %). Ces résultats sont à nuancer d'une part parce que les deux catégories d'AP sont efficaces et d'autre part parce que au moins sept études importantes ont eu lieu depuis cette analyse [11-17]. L'analyse de ces études d'une durée de six à 12 semaines et qui regroupent plus de 800 patients fait apparaître une efficacité des APSG significativement supérieure au placebo pour l'aripiprazole, la risperidone et l'olanzapine. On notera cependant que l'effet placebo, comme souvent en pédiatrie, est important (même si les différences sont significatives) ; à titre d'exemple dans l'étude de Findling, les sous-scores positifs et négatifs de la PANSS s'améliorent après six semaines en moyenne de 5,6 et 5,4 sous placebo versus de 8,1 et 6,6 sous 30 mg d'aripiprazole versus 7,6 et 6,9 sous 10 mg [12].

Quelques études ont évalué l'efficacité de la clozapine. L'étude de Kumra et al. compare la clozapine ($n=18$) et l'Olanzapine ($n=21$) à forte dose (26,2 mg [10-30]) chez des patients de $15,8 \pm 2,2$ ans [15]. Il apparaît que le nombre de répondeurs est en faveur de la clozapine (66% contre 33%, $p=0,038$), y compris lorsque l'on isole les patients ayant déjà eu des doses « moins élevées » d'olanzapine (62% contre 27%, $p=0,093$). L'étude de Shaw comparant la clozapine ($n=12$) et l'olanzapine ($n=13$) à des doses classiques ne montre pas de différence hormis une tendance en faveur de la clozapine sur les symptômes négatifs (Scale for the Assessment of Negative Symptoms [SANS], $p=0,08$) [18].

Au total, il semble nécessaire d'apporter une conclusion prudente. Les études, en particulier la méta-analyse d'Armenteros et al., ne montrent pas une meilleure efficacité des APSG par rapport aux AP première génération. L'attitude actuelle et consensuelle, qui consiste à proposer l'emploi systématique d'APSG en première intention est uniquement calquée sur les données de la psychiatrie adulte. Ce dernier point nécessite de s'interroger sur la tolérance de ces produits dans les populations pédiatriques qui pourrait être de nature à modifier le rapport bénéfice/risque d'autant plus que des travaux récents suggèrent que le profil d'effet indésirable est différent dans ces populations comparées aux adultes.

Efficacité dans les troubles bipolaires

Le trouble bipolaire de type I chez l'adolescent est aujourd'hui clairement reconnu ; sa prévalence est estimée à 0,1% (1% pour troubles bipolaires I et II) [19]. En revanche, les troubles bipolaires chez l'enfant prépubère restent controversés [20]. Il paraît donc important de garder une certaine prudence notamment quant aux traitements pharmacologiques chez les enfants les plus jeunes [21].

Il existe peu d'études contrôlées en double insu chez le sujet jeune évaluant l'efficacité des antipsychotiques dans l'indication des troubles bipolaires et la dernière méta-analyse de référence [22] concluait à une efficacité décevante des APSG. Cela peut s'expliquer par des critères méthodologiques marqués par un manque d'homogénéité en termes d'âge (enfants prépubères et/ou adolescents), en termes de phénotype (TB de type I, II, nos) et en termes de troubles comorbides (TDAH comorbide). Des études récentes sur des populations importantes (six études regroupant plus de 650 patients) viennent nuancer ces conclusions [23-28]. On peut citer en particulier une étude contrôlée, en double insu, évaluant l'efficacité thérapeutique de l'olanzapine versus placebo avec des critères méthodologiques rigoureux, ne prenant en compte en particulier que les adolescents, explorant l'efficacité thérapeutique de deux antipsychotiques atypiques : l'olanzapine et l'aripiprazole. L'échantillon clinique est celui de 161 adolescents âgés de 13 à 17 ans présentant un épisode maniaque ou mixte, soit un trouble bipolaire de type I [26]. En évaluant l'amélioration clinique avec la Young Mania Rating Scale (YMRS) [29], celle-ci est significativement supérieure dans le groupe des adolescents traités par olanzapine comparativement à ceux traités par placebo (45% versus 18,5%).

Notons enfin que la « FDA » autorise la prescription des sels de lithium dans le traitement des troubles bipolaires chez les adolescents âgés de plus de 12 ans. L'aripiprazole, l'olanzapine et la risperidone viennent d'obtenir aussi dans l'indication du trouble bipolaire de type I une autorisation de prescription entre 10 et 17 ans par la FDA. En France, la plupart des prescriptions sont hors AMM [30,31]. Les sels de lithium sont autorisés dans l'indication des troubles bipolaires à partir de 16 ans. Aucune autre molécule n'a l'AMM dans cette indication chez le sujet jeune.

Pour plus d'information sur ces questions, voire un état de la question récent [21].

Efficacité dans les troubles du comportement²

Les troubles du comportement concernées par les AP sont essentiellement dans le cadre de patients présentant un retard mental avec ou sans trouble envahissant du développement (TED).

Pour la population présentant un TED et des troubles du comportement, et au delà des « case reports » et des petites séries de cas, on retrouve quatre études contrôlées pour la risperidone versus placebo pour un total de 240 sujets de cinq à 18 ans [32-35]. Au total, l'efficacité sur l'agressivité et sur les comportements répétitifs était notable, les effets indésirables principaux étant une prise de poids, une hypersalivation et une sédation. On trouve une étude versus placebo pour l'olanzapine incluant 11 sujets et montrant une amélioration globale (CGI) [36]. Il n'existe aucune étude versus placebo concernant la clozapine et l'aripiprazole même si des études ouvertes avec l'aripiprazole montrent un taux de réponse satisfaisant. Il apparaît selon une revue récente que malgré leur usage extensif pour les troubles du comportement chez les patients présentant des TED que les APSG

² Les troubles hyperactifs avec déficit attentionnel ne sont pas traités ici.

n'ont pas encore suffisamment de preuves scientifiques de leur efficacité dans cette indication [37].

Les études concernant les comportements agressifs et violents chez des patients ayant un retard mental sans association à un TED, sont beaucoup plus nombreuses, elles justifieraient un article complet. Nous ne présenterons ici que les plus pertinentes. Là encore, la risperidone bénéficie d'un nombre très élevé d'études qui montrent dans leur ensemble un bénéfice pour les troubles du comportement, principalement lorsqu'il s'agit de trouble des conduites au sens des classifications américaines (DSMIV, [38]). On peut citer comme exemple l'étude d'Aman et al. [39] en double insu versus placebo sur 118 patients de cinq à 12 ans (Quotient Intellectuel Total [QIT] de 36 à 84) durant six semaines. Les données montrent une efficacité sur la réduction sur la symptomatologie de troubles des conduites en 1 semaine et qui persiste sur la durée de l'étude. Cette étude a été étendue sur une durée de 48 semaines pour 107 sujets, et l'effet sur la symptomatologie de trouble des conduites a été durable durant cette observation [40]. Une autre étude concerne la risperidone, elle est ouverte mais sur une population de presque 500 enfants (également avec un déficit intellectuel de 36 à 84 de QIT) ; l'évaluation de l'agressivité a été effectuée avec une échelle (Nisonger Child Behaviour Rating Form) et montre une amélioration en trois à quatre semaines durable sur un an (durée de l'étude) [41]. L'olanzapine a été étudiée également dans cette indication mais les études disposent d'un échantillon très restreint (de 16 à 23 adolescents). Dans le cas des troubles du comportements, nous pourrions conclure, en accord avec certains auteurs [42] que la risperidone a montré une certaine efficacité mais, en raison d'une tolérance moyenne (prise de poids, sédation en particulier) il est conseillé de l'utiliser dans les formes graves de troubles des conduites. Elle a, cependant, reçu l'AMM pour les troubles du comportement chez les patients avec retard mental (avec ou sans TED) présentant des troubles du comportement entre sept et 11 ans. Les études existantes prennent peu en compte le contexte environnemental et les prises en charge non médicamenteuse qui, nous le savons, ont une grande importance dans ces troubles.

Tolérance

La question essentielle concerne la tolérance des APSG chez l'enfant et l'adolescent. En effet, c'est elle qui va permettre d'évaluer le rapport bénéfice/risque qui est d'autant plus important dans cette population que les durées de prescriptions peuvent être très longues. De plus, des données, déjà anciennes mais rarement citées, font état d'un profil d'effet indésirable différent et plus sévère dans cette population. Une étude de pharmacovigilance concernant un large échantillon de prescriptions d'olanzapine ($n = 4\,332\,000$ dont 24 000 enfants et 23 400 adolescents) a mis en évidence une surreprésentation de certains effets secondaires déclarés chez l'enfant et l'adolescent par rapport à ceux retrouvés chez l'adulte. Il s'agit des effets sédatifs (présents à un risque relatif 4,5 fois supérieur chez les enfants et 1,9 fois supérieur chez les adolescents comparé aux adultes), de la prise de poids (présent à un risque relatif 4,3 fois supérieur chez les enfants et 3,2 fois supérieur chez les adolescents

comparé aux adultes), des dyskinésies tardives (4,5 fois supérieur chez les enfants comparé aux adultes mais similaire entre adultes et adolescents) même si elles sont très rares, et d'une augmentation de la prolactinémie [4].

L'étude des effets indésirables est complexe car ils ne sont pas systématiquement recherchés ou relevés dans les essais publiés, et leur présentation rend parfois difficile les comparaisons (nombre de patients au dessus d'un seuil, moyenne ou médiane des différences etc.). Nous pouvons distinguer les éléments du syndrome métabolique, l'hyperprolactinémie et les autres effets indésirables.

Syndrome métabolique

Le syndrome métabolique est défini par l'association de trois critères sur cinq concernant le taux de triglycérides, de cholestérol dans sa composante HDL, la glycémie à jeun ainsi que le tour de taille (on préfère l'index de masse corporelle ou IMC) et la tension artérielle systolique [43] dont les seuils de normalité, en particulier chez l'enfant et l'adolescent font l'objet de controverses. Nous avons retenus les critères les plus courants qui ne se réfèrent pas à des valeurs absolues mais à des percentiles qui varient en fonction de l'âge³.

La littérature dans ce domaine est encore réduite mais l'on retrouve des articles récents évaluant plusieurs voire tous les éléments que notre équipe a récemment analysés [44].

En ce qui concerne le poids, il apparaît, lorsque cela est étudié, que tous les APSG produisent une augmentation de poids supérieure au placebo. On peut retrouver une trentaine d'étude donnant cette information, pour un total de plus de 3000 patients incluant plusieurs types de pathologie. Les données suggèrent fortement que la prise de poids est la plus importante avec l'olanzapine, suivie de la clozapine, de la risperidone et de l'aripiprazole. À titre d'exemple, on va retrouver des prises de poids pour l'olanzapine de l'ordre de 0,4 à 0,7 kg/semaine [45-49]. Pour la risperidone, on observe une augmentation de poids de 4,9 kg sur six semaines pour 8 patients [50], de 1,6 kg sur huit semaines pour six patients [51], de 8,1 kg sur 12 semaines pour 18 patients [37], 8,6 kg sur 24 semaines pour 18 patients [52], 7 kg sur 24 semaines pour 37 patients [53]. Enfin, l'aripiprazole sur six semaines n'a montré qu'une prise de poids modérée de moins d'un kg sur une population de 200 enfants et adolescents [42]. Si le mécanisme des prises de poids reste encore à ce jour controversé et peu clair, il est probablement associé à une baisse de l'activité physique habituelle, de la sensation de satiété et à une augmentation de l'appétit et de la consommation alimentaire [54].

Les autres éléments du syndrome métabolique sont étudiés dans une dizaine d'étude et montrent des profils différents selon les molécules, il ont été étudiés récemment par notre équipe [44] avec des résultats en accords avec la littérature dans ce domaine [6,14] (Tableau 1). Signalons que certains produits comme la clozapine ne peuvent être

³ Ces valeurs de références peuvent être trouvées sur le site du centre maladie rare à expression psychiatrique : <http://crepsymar.aphp.fr/crepsymar.php?page=recommandations>.

Tableau 1 Comparaison des effets indésirables des différents antipsychotiques de secondes génération chez l'enfant et l'adolescent.

	Aripiprazole	Clozapine	Olanzapine	Risperidone
↗ Poids	+	++++	++++	++
↗ Glucose	+/-	?	+	++
↗ Cholestérol	0	?	+++	0
↗ Triglycérides	0	+++	++++	+/-
Hyperprolactinémie	0	?	+++	++++
Sédation	++	++++	++	++
Syndrome Extrapyramidal	+	0?	++	+

Basé sur l'analyse de la littérature, adapté de [49].

293 totalement évalué sur ce plan en raison de l'existence de
294 trop peu d'étude ou de faible population.

295 Citons à titre d'exemple, l'étude de Mc Evoy qui porte
296 sur de jeunes adultes présentant un 1^{er} épisode psychotique
297 et qui est d'une durée prolongée de 52 semaines. Il apparaît
298 que les produits comparés (risperidone et olanzapine) pré-
299 sentent tous les deux des perturbations métaboliques mais
300 dans des proportions différentes ; exprimées en variation par
301 rapport à la normale on note que l'hypertriglycéridémie,
302 l'hyperglycémie et l'hypocholestérolémie HDL va atteindre
303 7 ; 5 et 25% des sujets à l'inclusion pour passer à 25 ;
304 12 et 32 à 12 semaines et 40 ; 25 et 50 à 52 semaines pour
305 l'olanzapine. Les résultats pour la risperidone sont meilleurs
306 avec des variations inférieures à 10%. Une autre étude
307 récente a comparé ces deux produits, chez l'enfant et
308 l'adolescent cette fois (*n* = 119, huit à 19 ans). Ce travail
309 confirme le profil métabolique des produits avec des varia-
310 tions à huit semaines de 20% pour les triglycérides, peu de
311 variation pour le cholestérol et une augmentation de 100%
312 pour l'insulinémie à jeun dans le cas de l'olanzapine. Pour
313 la risperidone l'étude ne retrouve pas d'anomalie en dehors
314 d'une augmentation de moins de 10% des triglycérides et
315 peu d'effet indésirable métabolique [55].

316 L'adjonction de metformine atténue les risques métabo-
317 liques liés à l'utilisations des APSG, ce que tend à confirmer
318 une récente méta-analyse portant sur six études randomi-
319 sées versus placebo dont deux chez l'enfant et l'adolescent
320 [56].

321 Ces données métaboliques, chez l'adolescent, donnent
322 toute leur importance aux mesures de prévention inspi-
323 rées du Programme national nutrition santé qui doivent être
324 associées à la prescription des APSG (activité physique et
325 éducation nutritionnel). Il s'agit d'un enjeu majeur tant,
326 d'une part pour la qualité de vie de nos patients, la préven-
327 tion des risques liés à l'obésité et au syndrome métabolique,
328 que d'autre part pour la compliance et l'image corporelle
329 de nos patients.

330 Hyperprolactinémie

331 L'hyperprolactinémie est un effet connu de longue date des
332 traitements AP chez l'adulte. Cette élévation est même
333 considérée comme le reflet de l'action positive des AP sur
334 les réseaux dopaminergiques et en particulier sur le système
335 tubéro-infundibulaire qui régule la sécrétion hypophysaire
336 de la prolactine [57]. La mise au point des antipsychotiques

de deuxième génération, appelés également atypiques a
fait apparaître une distinction entre la risperidone et les
AP1 qui augmentent beaucoup la sécrétion de prolactine [58]
et les APSG qui l'augmentent de façon modérée comme la
clozapine [59] et l'olanzapine [60]. Il est à noter que la ris-
peridone est l'AP ayant fait l'objet du plus grand nombre de
rapport auprès de la FDA pour hyperprolactinémie [61] Chez
l'adolescent on retrouve également une hyperprolactinémie
modérée sous clozapine [62] et une augmentation de 80%
du taux de prolactine à huit semaines pour la risperidone
[55], souvent asymptomatique cependant. L'amisulpride
entraîne également une importante augmentation de la
prolactine. Si l'hyperprolactinémie peut rester asymptoma-
tique chez l'enfant et l'adolescent, elle peut néanmoins
occasionner une galactorrhée chez la fille et une gynéco-
mastie chez le garçon [3,63], notamment à l'adolescence.
L'adjonction de 10 mg/jour d'aripiprazole devrait permettre
de corriger l'hyperprolactinémie induite par la risperidone
ou l'amisulpride [64].

Les liens entre hyperprolactinémie, AP et risque
d'ostéoporose précoce font l'objet d'un intérêt spécifique
dans le cas des schizophrénies, en particulier depuis une
étude d'envergure montrant une augmentation du risque de
fracture de hanche chez les patients sous AP [65]. De plus
des données récentes montrent un déficit en vitamine D,
bien supérieure à celui de la population générale, chez les
adolescents présentant des troubles psychiatriques sévères
[66]. Même si des études dans des populations plus impor-
tantes sont nécessaire pour prouver l'implication de certains
APSG, il semble important de proposer une supplémen-
tation en vitamine D chez les patients présentant des troubles
sévéres et prenant des antipsychotiques. L'objectif est de
permettre aux adolescents d'avoir un taux de vitamine
D supérieur au seuil protecteur de l'ostéoporose précoce
[5,66].

372 Autres effets indésirables

373 Tous les APSG sont responsable d'une somnolence et une
374 asthénie accrue, cet effet sédatif est cependant parti-
375 culièrement important avec la clozapine [44]. À des
376 degrés variables, ils peuvent tous entraîner des symptômes
377 extrapyramidaux. De fréquence moindre, d'autres effets
378 indésirables ont été répertoriés parmi lesquels les dyskiné-
379 sies tardives, le syndrome malin des neuroleptiques et la

leucopénie voire l'agranulocytose qui ne concerne pas que la clozapine exclusivement.

Mentionnons également que certains effets indésirables peuvent être dose-dépendants et qu'il est souvent opportun de s'appuyer sur un taux plasmatique de l'APSG pour ajuster la conduite à tenir lors de la survenue d'effets secondaires [67]. Au-delà des variations interindividuelles dans le métabolisme des APSG qui définissent des métaboliseurs lents, rapides et ultra-rapides, les interactions médicamenteuses sont fréquentes chez les enfants et adolescents en cas de polymédication ou de consommations de substances.

Bien que la clinique quotidienne et quelques données de la littérature [4] suggèrent que les effets indésirables des APSG sont plus important que nous l'avions d'abord pensé et que leur profil est différents de ce que l'on observe chez l'adulte, il est encore difficile de l'affirmer. Des études dans ce domaine, et en particulier des comparaisons entre populations d'enfant et d'adolescent et populations adultes sont nécessaires. Cela étant dit, il est primordial de prévenir et de prendre en charge ces effets indésirables qui sont facteurs de non compliance et de diminution de la qualité de vie.

Conclusion

La littérature scientifique, comme notre pratique quotidienne, suggèrent fortement que les APSG, comme ceux de première génération ont une action sur les symptômes psychiatriques dans les schizophrénies à début précoce, les troubles bipolaires et les formes sévères de troubles externalisés, principalement s'il existe un déficit intellectuel. Les études sont cependant moins nombreuses que dans les populations adultes ; ce point est particulièrement notable pour les troubles du comportement sans retard mental (qui sont une catégorie nosographique particulièrement hétérogène) et les schizophrénies à début précoce. La question de l'efficacité ne doit pas faire oublier celle de la tolérance qui pondère l'enthousiasme initial pour les APSG, notamment par rapport au risque métabolique. Il apparaît aujourd'hui que le profil de tolérance qui est différent en fonction des produits est également variable selon l'âge du sujet. En attendant le développement de nouvelles molécules, plus spécifiques dans leurs actions thérapeutiques et avec un meilleur profil de tolérance que les APSG, des études importantes incluant des populations pédiatriques et adultes sont absolument nécessaires et devront s'effectuer sur de longues durées. La durée de l'étude est, en effet, un facteur primordial car les patients sont jeunes et peuvent être amenés à prendre ces traitements pendant ne nombreuses années dans certaines indications. Des études comparatives avec des AP1 sont également souhaitables. Seuls ces types d'études permettront une réelle évaluation du rapport bénéfice/risque des APSG et de leur légitimité comme traitement de première intention chez l'enfant et l'adolescent.

Déclaration d'intérêts

Les auteurs n'ont pas transmis de déclaration de conflits d'intérêts.

Références

- [1] Merikangas KR, He JP, Burstein M, Swanson SA, Avenevoli S, Cui L, et al. Lifetime prevalence of mental disorders in U. S. adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication—Adolescent Supplement (NCS-A). *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2010;49(10):980–9.
- [2] Hugtenburg JG, Heerdink ER, Tso YH. Psychoactive drug prescribing by Dutch child and adolescent psychiatrists. *Acta Paediatr* 2005;94(10):1484–7.
- [3] Acquaviva E, Legleye S, Auleley GR, Deligne J, Carel D, Falissard BB. Psychotropic medication in the French child and adolescent population: prevalence estimation from health insurance data and national self-report survey data. *BMC Psychiatry* 2009;9:72.
- [4] Woods SW, Martin A, Spector SG, McGlashan TH. Effects of development on olanzapine-associated adverse events. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2002;41(12):1439–46.
- [5] Bonnot O, Inaoui R, Lloret C, Cohen D. Surveillance of metabolic syndrome, hyperprolactinemia and cardiac side effects in children and adolescent treated with antipsychotic. *Actuality and recommendations. Neuropsychiatr Enfance Adolesc* 2009, doi:10.1016/j.neurenf.2009.09.004 [Article in press].
- [6] Correll CU, Manu P, Olshanskiy V, Napolitano B, Kane JM, Malhotra AK. Cardiometabolic risk of second-generation antipsychotic medications during first-time use in children and adolescents. *JAMA* 2009;302(16):1765–73.
- [7] Bonnot O, Cohen D. Les schizophrénies à début précoce. In: Danion-Grillat A, Bursztejn C, editors. *Psychiatrie de l'Enfant*. Paris: Lavoisier; 2011. p. 270–9.
- [8] Meyer JM, Nasrallah HA, McEvoy JP, Goff DC, Davis SM, Chakos M, et al. The Clinical Antipsychotic Trials Of Intervention Effectiveness (CATIE) Schizophrenia Trial: clinical comparison of subgroups with and without the metabolic syndrome. *Schizophr Res* 2005;80(1):9–18.
- [9] Citrome L, Stroup TS. Schizophrenia, Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) and number needed to treat: how can CATIE inform clinicians? *Int J Clin Pract* 2006;60(8):933–40.
- [10] Armenteros JL, Davies M. Antipsychotics in early onset Schizophrenia: systematic review and meta-analysis. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 2006;15(3):141–8.
- [11] Haas M, Eerdeken M, Kushner S, Singer J, Augustyns I, Quiroz J, et al. Efficacy, safety and tolerability of two dosing regimens in adolescent schizophrenia: double-blind study. *Br J Psychiatry* 2009;194(2):158–64.
- [12] Findling RL, Robb A, Nyilas M, Forbes RA, Jin N, Ivanova S, et al. A multiple-center, randomized, double-blind, placebo-controlled study of oral aripiprazole for treatment of adolescents with schizophrenia. *Am J Psychiatry* 2008;165(11):1432–41.
- [13] Kryzhanovskaya L, Schulz SC, McDougale C, Frazier J, Dittmann R, Robertson-Plouch C, et al. Olanzapine versus placebo in adolescents with schizophrenia: a 6-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2009;48(1):60–70.
- [14] Sikich L, Frazier JA, McClellan J, Findling RL, Vitiello B, Ritz L, et al. Double-blind comparison of first- and second-generation antipsychotics in early-onset schizophrenia and schizo-affective disorder: findings from the treatment of early-onset schizophrenia spectrum disorders (TEOSS) study. *Am J Psychiatry* 2008;165(11):1420–31.
- [15] Kumra S, Kranzler H, Gerbino-Rosen G, Kester HM, De Thomas C, Kafantaris V, et al. Clozapine and "high-dose" olanzapine in refractory early-onset schizophrenia: a 12-week randomized and double-blind comparison. *Biol Psychiatry* 2008;63(5):524–9.

435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

- 502 [16] Jensen JB, Kumra S, Leitten W, Oberstar J, Anjum A, 570
503 White T, et al. A comparative pilot study of second- 571
504 generation antipsychotics in children and adolescents with 572
505 schizophrenia-spectrum disorders. *J Child Adolesc Psychophar-* 573
506 *macol* 2008;18(4):317-26. 574
- 507 [17] Haas M, Unis AS, Armenteros J, Copenhaver MD, Quiroz JA, 575
508 Kushner SF. A 6-week, randomized, double-blind, placebo- 576
509 controlled study of the efficacy and safety of risperidone in 577
510 adolescents with schizophrenia. *J Child Adolesc Psychophar-* 578
511 *macol* 2009;19(6):611-21. 579
- 512 [18] Shaw P, Sporn A, Gogtay N, Overman GP, Greenstein D, Goch- 580
513 man P, et al. Childhood-onset schizophrenia: a double-blind, 581
514 randomized clozapine-olanzapine comparison. *Arch Gen Psy-* 582
515 *chiatry* 2006;63(7):721-30. 583
- 516 [19] Kim-Cohen J, Caspi A, Moffitt TE, Harrington H, Milne BJ, 584
517 Poulton R. Prior juvenile diagnoses in adults with mental 585
518 disorder: developmental follow-back of a prospective- 586
519 longitudinal cohort. *Arch Gen Psychiatry* 2003;60(7): 587
520 709-17. 588
- 521 [20] Carlson GA. Treating the childhood bipolar controversy: a tale 589
522 of two children. *Am J Psychiatry* 2009;166(1):18-24. 590
- 523 [21] Gramond A, Consoli A, Maury M, Purper D. Les Thymorégulé- 591
524 Q4 lateurs chez l'enfant et l'adolescent. *Neuropsychiatr Enfance* 592
525 *Adolesc* 2011 [in press]. 593
- 526 [22] Consoli A, Deniau E, Huynh C, Purper D, Cohen D. Treatments 594
527 in child and adolescent bipolar disorders. *Eur Child Adolesc* 595
528 *Psychiatry* 2007;16(3):187-98. 596
- 529 [23] Findling RL, Nyilas M, Forbes RA, McQuade RD, Jin N, 597
530 Iwamoto T, et al. Acute treatment of pediatric bipolar I 598
531 disorder, manic or mixed episode, with aripiprazole: a randomi- 599
532 zed, double-blind, placebo-controlled study. *J Clin Psychiatry* 600
533 2009;70(10):1441-51. 601
- 534 [24] Haas M, Delbello MP, Pandina G, Kushner S, Van Hove I, Augus- 602
535 tyns I, et al. Risperidone for the treatment of acute mania 603
536 in children and adolescents with bipolar disorder: a randomi- 604
537 zed, double-blind, placebo-controlled study. *Bipolar Disord* 605
538 2009;11(7):687-700. 606
- 539 [25] Pavuluri MN, Henry DB, Findling RL, Parnes S, Carbray JA, 607
540 Mohammed T, et al. Double-blind randomized trial of risperidone 608
541 versus divalproex in pediatric bipolar disorder. *Bipolar* 609
542 *Disord* 2010;12(6):593-605. 610
- 543 [26] Tohen M, Kryzhanovskaya L, Carlson G, Delbello M, Wozniak 611
544 J, Kowatch R, et al. Olanzapine versus placebo in the treat- 612
545 ment of adolescents with bipolar mania. *Am J Psychiatry* 613
546 2007;164(10):1547-56. 614
- 547 [27] Tramontina S, Zeni CP, Ketzer CR, Pheula GF, Narvaez J, 615
548 Rohde LA. Aripiprazole in children and adolescents with 616
549 bipolar disorder comorbid with attention-deficit/hyperactivity 617
550 disorder: a pilot randomized clinical trial. *J Clin Psychiatry* 618
551 2009;70(5):756-64. 619
- 552 [28] Wozniak J, Mick E, Waxmonsky J, Kotarski M, Hantsoo L, Bieder- 620
553 man J. Comparison of open-label, 8-week trials of olanzapine 621
554 monotherapy and topiramate augmentation of olanzapine for 622
555 the treatment of pediatric bipolar disorder. *J Child Adolesc* 623
556 *Psychopharmacol* 2009;19(5):539-45. 624
- 557 [29] Youngstrom EA, Danielson CK, Findling RL, Gracious BL, Cala- 625
558 brese JR. Factor structure of the Young Mania Rating Scale for 626
559 use with youths ages 5 to 17 years. *J Clin Child Adolesc Psychol* 627
560 2002;31(4):567-72. 628
- 561 [30] Marcelli D, Cohen D. *Enfance et psychopathologie*. Paris: Mas- 629
562 son; 2008. 630
- 563 [31] Winterfeld U, Le Heuzey MF, Acquaviva E, Mouren MC, Brion 631
564 F, Bourdon O. Psychotropic medication use in the child and 632
565 adolescent psychiatry wards of a French hospital. *Pharm World* 633
566 *Sci* 2008;30(5):600-4. 634
- 567 [32] Nagaraj R, Singhi P, Malhi P. Risperidone in children with autism: 635
568 randomized, placebo-controlled, double-blind study. *J Child* 636
569 *Neurol* 2006;21(6):450-5. 637
- [33] Luby J, Mrakotsky C, Stalets MM, Belden A, Heffelfinger A, 570
Williams M, et al. Risperidone in preschool children with autistic 571
spectrum disorders: an investigation of safety and efficacy. *J Child Adolesc Psychopharmacol* 2006;16(5):575-87. 572
573
- [34] Shea S, Turgay A, Carroll A, Schutz M, Orlik H, Smith I, et al. Risperidone in the treatment of disruptive behavioral symptoms in children with autistic and other pervasive developmental disorders. *Pediatrics* 2004;114(5):e634-41. 574
575
576
577
- [35] McCracken JT, McGough J, Shah B, Cronin P, Hong D, Aman MG, et al. Risperidone in children with autism and serious behavioral problems. *N Engl J Med* 2002;347(5):314-21. 578
579
- [36] Hollander E, Wasserman S, Swanson EN, Chaplin W, Schapiro ML, Zagursky K, et al. A double-blind placebo-controlled pilot study of olanzapine in childhood/adolescent pervasive developmental disorder. *J Child Adolesc Psychopharmacol* 2006;16(5):541-8. 580
581
582
583
584
585
- [37] McDougle CJ, Stigler KA, Erickson CA, Posey DJ. Atypical antipsychotics in children and adolescents with autistic and other pervasive developmental disorders. *J Clin Psychiatry* 2008;69(Suppl. 4):15-20. 586
587
588
589
- [38] American Psychiatric Association. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-IV-TR (Text Revision)*. 4th edition. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000. 590
591
- [39] Aman MG, De Smedt G, Derivan A, Lyons B, Findling RL. Double-blind, placebo-controlled study of risperidone for the treatment of disruptive behaviors in children with subaverage intelligence. *Am J Psychiatry* 2002;159(8):1337-46. 592
593
594
595
596
- [40] Findling RL, Aman MG, Eerdeken M, Derivan A, Lyons B. Long-term, open-label study of risperidone in children with severe disruptive behaviors and below-average IQ. *Am J Psychiatry* 2004;161(4):677-84. 597
598
599
600
- [41] Croonenberghs J, Fegert JM, Findling RL, De Smedt G, Van Dongen S. Risperidone in children with disruptive behavior disorders and subaverage intelligence: a 1-year, open-label study of 504 patients. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2005;44(1):64-72. 601
602
603
604
605
- [42] Findling RL. Atypical antipsychotic treatment of disruptive behavior disorders in children and adolescents. *J Clin Psychiatry* 2008;69(Suppl. 4):9-14. 606
607
608
- [43] Saland JM. Update on the metabolic syndrome in children. *Curr Opin Pediatr* 2007;19(2):183-91. 609
610
- [44] Cohen D, Bonnot O, Bodeau N, Consoli A, Laurent C. Adverse effects of second generation antipsychotics in children and adolescents: a Bayesian meta-analysis. 2011. Non publié - En préparation. 611
612
613
614
- [45] Malone RP, Cater J, Sheikh RM, Choudhury MS, Delaney MA. Olanzapine versus haloperidol in children with autistic disorder: an open pilot study. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2001;40(8):887-94. 615
616
617
618
- [46] Frazier JA, Biederman J, Tohen M, Feldman PD, Jacobs TG, Toma V, et al. A prospective open-label treatment trial of olanzapine monotherapy in children and adolescents with bipolar disorder. *J Child Adolesc Psychopharmacol* 2001;11(3):239-50. 619
620
621
622
- [47] Ratzoni G, Gothelf D, Brand-Gothelf A, Reidman J, Kikinzon L, Gal G, et al. Weight gain associated with olanzapine and risperidone in adolescent patients: a comparative prospective study. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2002;41(3):337-43. 623
624
625
626
627
- [48] Grothe DR, Calis KA, Jacobsen L, Kumra S, DeVane CL, Rapoport JL, et al. Olanzapine pharmacokinetics in pediatric and adolescent inpatients with childhood-onset schizophrenia. *J Clin Psychopharmacol* 2000;20(2):220-5. 628
629
630
- [49] Keltner NL. Biological perspectives. Metabolic syndrome: schizophrenia and atypical antipsychotics. *Perspect Psychiatr Care* 2006;42(3):204-7. 631
632
633
- [50] Armenteros JL, Whitaker AH, Welikson M, Stedje DJ, Gorman J. Risperidone in adolescents with schizophrenia: an open pilot study. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1997;36(5):694-700. 634
635
636
637

- 638 [51] Findling RL, Maxwell K, Wiznitzer M. An open clinical trial of ris- 669
 639 peridone monotherapy in young children with autistic disorder. 670
 640 *Psychopharmacol Bull* 1997;33(1):155–9. 671
 641 [52] Kelly DL, Conley RR, Love RC, Horn DS, Ushchak CM. Weight gain 672
 642 in adolescents treated with risperidone and conventional anti- 673
 643 psychotics over six months. *J Child Adolesc Psychopharmacol* 674
 644 1998;8(3):151–9. 675
 645 [53] Martin A, Landau J, Leebens P, Ulizio K, Cicchetti D, Scahill 676
 646 L, et al. Risperidone-associated weight gain in children and 677
 647 adolescents: a retrospective chart review. *J Child. Adolesc Psy-* 678
 648 *chopharmacol* 2000;10(4):259–68. 679
 649 [54] Gothelf D, Falk B, Singer P, Kairi M, Phillip M, Zigel L, 680
 650 et al. Weight gain associated with increased food intake 681
 651 and low habitual activity levels in male adolescent schizo- 682
 652 phrenic inpatients treated with olanzapine. *Am J Psychiatry* 683
 653 2002;159(6):1055–7. 684
 654 [55] Sikich L. Efficacy of atypical antipsychotics in early-onset schi- 685
 655 zophrenia and other psychotic disorders. *J Clin Psychiatry* 686
 656 2008;69(Suppl. 4):21–5. 687
 657 [56] Ehret M, Goethe J, Lanosa M, Coleman CI. The effect of met- 688
 658 formin on anthropometrics and insulin resistance in patients 689
 659 receiving atypical antipsychotic agents: a meta-analysis. *J Clin* 690
 660 *Psychiatry* 2010;71(10):1286–92. 691
 661 [57] Langer G, Sachar EJ, Gruen PH, Halpern FS. Human prolactin 692
 662 responses to neuroleptic drugs correlate with antischizophre- 693
 663 nic potency. *Nature* 1977;266(5603):639–40. 694
 664 [58] Tran PV, Hamilton SH, Kuntz AJ, Potvin JH, Andersen SW, Beas- 695
 665 ley Jr C, et al. Double-blind comparison of olanzapine versus 696
 666 risperidone in the treatment of schizophrenia and other psy- 697
 667 chotic disorders. *J Clin Psychopharmacol* 1997;17(5):407–18. 698
 668 [59] Breier AF, Malhotra AK, Su TP, Pinals DA, Elman I, Adler CM, 699
 669 et al. Clozapine and risperidone in chronic schizophrenia: 700
 670 effects on symptoms, parkinsonian side effects, and neuroen-
 671 docrine response. *Am J Psychiatry* 1999;156(2):294–8.
 672 [60] David SR, Taylor CC, Kinon BJ, Breier A. The effects of olanza-
 673 pine, risperidone, and haloperidol on plasma prolactin levels
 674 in patients with schizophrenia. *Clin Ther* 2000;22(9):1085–96.
 675 [61] Szarfman A, Tonning JM, Levine JG, Doraiswamy PM. Atypical
 676 antipsychotics and pituitary tumors: a pharmacovigilance
 677 study. *Pharmacotherapy* 2006;26(6):748–58.
 678 [62] Sporn AL, Vermani A, Greenstein DK, Bobb AJ, Spencer EP,
 679 Clasen LS, et al. Clozapine treatment of childhood-onset
 680 schizophrenia: evaluation of effectiveness, adverse effects,
 681 and long-term outcome. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*
 682 2007;46(10):1349–56.
 683 [63] Holzer L, Eap CB. Risperidone-induced symptomatic hyper-
 684 prolactinaemia in adolescents. *J Clin Psychopharmacol*
 685 2006;26(2):167–71.
 686 [64] van Kooten M, Arends J, Cohen D. Preliminary report: a
 687 naturalistic study of the effect of aripiprazole addition on
 688 risperidone-related hyperprolactinemia in patients treated
 689 with risperidone long-acting injection. *J Clin Psychopharmacol*
 690 2011;31(1):126–8.
 691 [65] Howard L, Kirkwood G, Leese M. Risk of hip fracture in
 692 patients with a history of schizophrenia. *Br J Psychiatry*
 693 2007;190:129–34.
 694 [66] Bonnot O, Inaoui R, Raffin-Viard M, Bodeau N, Coussieux F,
 695 Cohen D. Children and adolescents with severe mental illness
 696 need Vitamin D supplementation regardless of disease or treat-
 697 ment. *J Child Adolesc Psychopharmacol* 2011 [in press].
 698 [67] Jaquenoud Sirot E, van der Velden JW, Rentsch K, Eap
 699 CB, Baumann P. Therapeutic drug monitoring and phar-
 700 macogenetic tests as tools in pharmacovigilance. *Drug Saf*
 2006;29(9):735–68.

Formation continue

UNCORRECTED PROOF